

# OCU<sup>h</sup>yl<sup>C</sup>®

Akių lašai (tirpalas), be konservantų

**APPROVED**

By Žydrūnė Urbanavičiūtė at 9:44 am, Nov 03, 2020

## 1. Kas yra OCU<sup>h</sup>yl<sup>C</sup> ir kam jis naudojamas

OCU<sup>h</sup>yl<sup>C</sup> yra akių lašai (tirpalas) be konservantų, jų sudėtyje yra natrio hialuronato ir medetkų ekstrakto. OCU<sup>h</sup>yl<sup>C</sup> sukelia drėkinamąjį, raminaujamąjį ir tepamąjį poveikį. Dėl sudėtyje esančios hialurono rūgšties (medžiagos, natūraliai susidaranti akyse ir kitose organizmo vietose) šie akių lašai veiksmingi mažina akių sausumą, deginimą ir nuovargį bei sukelia ilgalaikį akių komforto pojūtį. Akių lašuose esantis medetkų ekstraktas apsaugo akių epitelį, slopina jo uždegimą ir skatina regeneraciją.

OCU<sup>h</sup>yl<sup>C</sup> yra naudojama sumažėjus ašarų išsiskyrimui, siekiant sudrėkinti, apsaugoti ir sutepti akių paviršių, bei esant būklėms, susijusioms su akies sausumo simptomais:

- sausajam keratokonjunktyvitui (pasireiškia ašarų stoka, deginimas, pažeidimo pojūtis, šviesos baimė ir svetimkūnio pojūtis akyje);
- ragenos pažeidimui, ragenos erozijai, būklei po ragenos operacijos;
- hormoniniams pokyčiams (menopauzei);
- ilgai naudojantis kompiuteriu, ilgai vairuojant, ilgų skrydžių metu;
- būnant patalpoje, kur kondicionuojamas oras, arba aplinkoje, kur yra vėjuota, šalta, sausa ir karšta, yra dulkių, dūmų ar užterštas oras.

OCU<sup>h</sup>yl<sup>C</sup> sudėtyje nėra konservantų, todėl šie akių lašai ypač tinka žmonėms, kurie nešioja akių kontaktinius lęšius ir kurių akys yra jautrios.

OCU<sup>h</sup>yl<sup>C</sup> gali naudoti suaugusieji, paaugliai ir vaikai.

## 2. Kas žinotina prieš naudojant OCU<sup>h</sup>yl<sup>C</sup>

OCU<sup>h</sup>yl<sup>C</sup> negalima naudoti, jei yra alergija bet kuriai akių lašų sudedamajai medžiagai.

Jei tuo pat metu naudojate kitokių akių preparatų, paprastai rekomenduojama, kad tarp jų lašinimo praeitų ne mažiau kaip 5 minutės.

## 3. Kaip naudoti OCU<sup>h</sup>yl<sup>C</sup>


Paprastai 1-3 kartus per dieną lašinamas 1 lašas, tačiau galima naudoti ir dažniau. OCU<sup>h</sup>yl<sup>C</sup> galima naudoti ilgai.

### Kontaktinius lęšius nešiojantys žmonės

OCU<sup>h</sup>yl<sup>C</sup> galima naudoti įsidėjus kontaktinius lęšius.

### Atsargumo priemonės prieš naudojimą

1. Nusiplaukite rankas ir patogiai atsisėskite ar atsistokite.
2. Nusukite buteliuko dangtelį.




3. Buteliuką laikykite apverstą nykščiu ir kitu pirštu.
4. Prieš pirmąjį naudojimą rekomenduojama švelniai spaudžiant buteliuką nulašinti pirmą lašą, nes dėl stipraus ir netolygaus buteliuko suspaudimo gali būti išspausstas didesnis tūris.
5. Pirštu švelniai patraukite pažeistos akies voką žemyn.



6. Lašintuvo galiuką priartinkite prie akies, tačiau jos ar aplinkinių sričių liesti negalima.
7. Švelniai suspauskite buteliuką, kad į akį įkristų tik 1 lašas. Tada atleiskite apatinį voką ir lėtai užsimerkite, kad OCU<sup>h</sup>yl<sup>C</sup> tolygiai pasiskirstytų akies paviršiuje.

Norėdami įlašinti kitą lašą, įtraukite orą atgal į plastikinį buteliuką, kad jis sugrįžtų į pradinę padėtį, ir tada vėl lašinkite į akį, kaip rekomenduojama. Žinokite, kad tarp buteliuko suspaudimo ir lašo nukritimo gali praeiti kelios sekundės. Buteliuko negalima spausti per stipriai.



8. Jei reikia, procedūrą pakartokite į kitą akį.



9. Po panaudojimo buteliuką reikia vieną kartą pakratyti žemyn (galiuko liesti negalima), kad iš galiuko būtų pašalintas bet koks skysčio likutis. Tai reikalinga akių lašų sterilumui užtikrinti ir lašinimui palengvinti kito naudojimo metu.

10. Iš karto po panaudojimo sandariai užsukite buteliuko dangtelį.

#### 4. Galimas šalutinis poveikis

Retai iš karto po panaudojimo gali pasireikšti nestiprus laikinas deginimo pojūtis ar alerginė reakcija į kurią nors sudedamąją medžiagą.

Jeigu atsiranda bet kokių minėtų simptomų ar kitokių neįprastų reakcijų, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.

#### 5. OCU<sup>hyf</sup>C sudėtis

Natrio hialuronatas 1,2 mg/1 ml, medetkų ekstraktas, natrio chloridas, kalio chloridas, kalcio chloridas dihidratas, magnio chloridas heksahidratas, natrio acetatas trihidratas, natrio citratas, išgrynintas vanduo.

#### 6. Kaip laikyti OCU<sup>hyf</sup>C ir kita informacija

Buteliuką laikyti gamintojo dėžutėje, 25 °C temperatūroje.

Negalima šaldyti ar užšaldyti.

Laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nepastebimoje vietoje.

Ant etiketės ar dėžutės šalia smėlio laikrodžio piktogramos nurodytam tinkamumo laikui pasibaigus, šių akių lašų naudoti negalima. Akių lašai tinkami naudoti iki paskutinės nurodyto mėnesio dienos.

Po pirmojo buteliuko atidarymo praėjus 3 mėnesiams, OCU<sup>hyf</sup>C naudoti nebegalima.

**Pakuotės dydis:** 1 x 10 ml



UNIMED PHARMA, spol. s r.o., Orišková 11, 821 05 Bratislava,  
Slovakijos Respublika

Tel.: +421 2 4333 3786

Faksas: +421 2 4363 8743

El. paštas: [unimedpharma@unimedpharma.sk](mailto:unimedpharma@unimedpharma.sk)

[www.unimedpharma.eu](http://www.unimedpharma.eu)



Ši instrukcija paskutinį kartą atnaujinta 2020 m. balandžio mėn.